

PROTOCOLE ADMINISTRATION D'UN ANTIPYRÉTIQUE

DEFINITION :

L'antipyrétique est un médicament pour traiter la douleur et la fièvre.

Il est à administrer en cas de fièvre ou de douleur non soulagée :

- **ENFANT > 3 mois Température > à 38°C consultation conseillée**
- **ENFANT < 3 mois Température > 38° Consultation obligatoire**

MATERIEL :

- Gants à usage unique
- Doliprane sirop ou suppositoire
- Balance

CONDUITE A TENIR :

En période Covid, les parents sont tenus de chercher l'enfant dans les plus brefs délais. En cas d'impossibilité les personnes mandatées doivent pouvoir se rendre disponibles rapidement.

Préparation :

- Mettre l'enfant en body, lui mettre un gant de toilette mouillé sur le front et lui donner à boire après la première prise de température.
- Attendre une demi-heure avant de reprendre la température.

Déroulement si la fièvre ne baisse pas, que l'enfant est inconfortable, ou n'a pas son comportement habituel :

- **Informé un des parents de l'état général de l'enfant (température, comportement) et s'assurer que l'enfant n'a pas eu de doliprane dans les 6 dernières heures.**
- Peser l'enfant
- Se laver les mains
- Préparer la dose de doliprane en fonction du poids de l'enfant
- Rassurer l'enfant pendant tout le soin et lui expliquer ce qui va se passer

Antipyrétique = Doliprane sirop :

- Remplir la pipette selon le poids de l'enfant
- Mettre la pipette dans la bouche de l'enfant (entre la joue et la gencive), appuyé doucement sur le piston (la prise peut se faire en plusieurs gorgées)

Antipyrétique = Doliprane suppositoire :

- Installer l'enfant sur le plan de change avec sa serviette
- Le déshabiller et ouvrir sa couche
- Ouvrir le suppositoire mais le laisser dans la capsule
- Mettre des gants à usage unique
- Insérer le doliprane par la partie plate
- Jeter les gants à usage unique
- Se laver les mains

Fin du soin :

- Mettre l'enfant dans un endroit frais et calme sous surveillance
- Donner régulièrement à boire
- Prendre la température de l'enfant toutes les 30 minutes

Traçabilité :

- Noter l'heure d'administration du doliprane

CONSIGNES A L'EQUIPE :

- Pas de vessie de glace ni d'enveloppement frais sur l'enfant.
- Si l'état de santé de l'enfant s'aggrave de manière considérable, (troubles de la conscience ; convulsions) appelé le SAMU
- **Le doliprane en suppositoire est à utiliser UNIQUEMENT en cas de vomissement sur recommandation de l'infirmière ou de la direction**
- C'est à l'infirmière en priorité de donner un médicament selon une prescription médicale établie par un médecin.
- En cas d'absence de l'infirmière, se référer à l'équipe de direction.
- Si l'équipe de direction n'est pas là, c'est à l'Auxiliaire de Puériculture puis aux EJE de donner un traitement pour assurer une continuité de suivi.

LENDEMAIN :

- Si l'enfant hyperthermique la veille revient le lendemain sans fièvre, nous l'acceptons.
- **Aucun enfant avec de la fièvre ne sera accepté.**

Nous soussigné(e)s

Parents de l'enfant

Autorisons les responsables à administrer un anti pyrétique (paracétamol sous forme de sirop ou exceptionnellement sous forme de suppositoire) adapté à notre enfant en cas de fièvre selon le protocole établi par le Multi Accueil et **nous nous engageons à venir chercher notre enfant dans les plus brefs délais.**

Fait à :

Le :

Signature Parent 1 :

Signature Parent 2 :